



frauenärztin dr. anke schüler

Sehr geehrte Patientin,

Bei Ihnen soll eine Eileiterdurchgängigkeitsprüfung mittels Ultraschall erfolgen (HSKS). Um die Untersuchung für Sie so schonend und einfach wie möglich zu gestalten, ist eine Vorbehandlung mit Hormonen sinnvoll.

Hierzu empfehlen wir das Medikament Estradiol 2 mg. Die Einnahme soll 10 Tage vor der Untersuchung begonnen werden.

Um die Terminabsprache kurzfristig möglich zu machen, möchten wir Sie bitten folgende Punkte zu beachten:

1. Am 1.Tag der Blutung melden Sie sich bitte telefonisch bei uns.
2. Wenn der Untersuchungstermin feststeht (ca. 12.–15. Zyklustag), sollte der Beginn der Tabletteneinnahme festgelegt werden:  
Am 1. Tag der Einnahme 2 Tbl., an jedem weiterem Tag 3 Tbl., am Tag der Untersuchung die letzte Tbl. einnehmen.

**Einnahmeschema für HSKS am 13. Zyklustag**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Zyklustage		

3. Wenn Sie innerhalb von 24 Stunden vor der Untersuchung Geschlechtsverkehr haben, können wir zusätzlich beurteilen, ob sich Spermien und Schleim vertragen (Ausschluß einer „Paarallergie“).